

CABRERA-32

A. CABRERA

ALGUNOS *NOMINA MUTANDA* EN LOS CARNÍVOROS



Extracto del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.

Tomo xvii, 1917 (páginas 487-488).

MADRID, 1917

P no NO

Algunos *nomina mutanda* en los carnívoros

por

Angel Cabrera.

En una reciente, interesantísima nota sobre los musangs de la India (1), el notable zoólogo Mr. R. C. Wroughton, tan conocido por sus trabajos sobre los mamíferos de aquella región, asigna a la forma común en la península el nombre de *Paradoxurus niger*, al parecer con carácter definitivo. Este nombre, sin embargo, no puede conservarse, puesto que está basado en *Viverra nigra* Desmarest, 1820, cuya denominación se encuentra invalidada por *Viverra nigra* Peale y Beauvois, 1796 (2), que es el mustélido llamado más generalmente *Mephitis putida* o *M. americana*. Según el mismo Wroughton, el nombre inmediatamente aplicable al musang de la India es *Viverra bondar*, empleado por Desmarest en la misma obra que *V. nigra* y sólo dos páginas más adelante. Es verdad que el autor francés no fijó localidad para esta especie, pero Blanford, que examinó el dibujo en que estaba basada, afirma que fué hecho en Bengala y que representa «unmistakably» la forma propia del país (3). *Paradoxurus bondar* es, por consiguiente, el nombre que debe llevar la especie. También pudiera referirse a ella la *Viverra prehensilis* de Desmarest, anterior a *nigra* y a *bondar*, pero tampoco este nombre puede emplearse, por haberlo dado Kerr en 1792 a otro animal.

Dentro del mismo orden *Carnivora* hay algunos otros nombres que deben cambiarse. En mi trabajo sobre las hienas manchadas, hace seis años (4), di el nombre *capensis* Desmarest, 1820, a la *Crocotta* del África austral. El mismo nombre, sin embargo, fué empleado mucho antes de Desmarest por Bechstein (5) para el *Canis crocuta* de Erxleben, y como este último, o sea la *Crocotta crocuta*, corresponde por eliminación a la forma del Senegal, según

(1) *Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.*, xxv, 1917, pág. 50.

(2) *Catal Peale's Mus.*, pág. 37. Véase Hollister, *Proceed. Biol. Soc. Washington*, xxvii, 1914, p. 215.

(3) *Proc. Zool. Soc. London*, 1885, p. 792.

(4) *Proc. Zool. Soc. London*, 1911, p. 96.

(5) *Pennants Ueber Vierf. Thiere*, II, 1800, p. 675.



creo haber demostrado en el referido trabajo, claro está que a la hiena del Cabo habrá que llamarla de otra manera. *Hyæna maculata* Smuts, 1832, tampoco sirve, pues veintidós años antes lo empleó Thunberg también para la forma tipo del grupo. Por consiguiente, *cuvieri* Boitard (*Jard. Plantes*, 1845, p. 232), con el Cabo como localidad típica y cuya descripción conviene perfectamente a la forma de que se trata, parece ser el nombre realmente válido.

El chacal abisinio corrientemente conocido como *Canis variegatus* no puede seguir llamándose así, pues este nombre, que data del atlas del viaje de Rüppell, por Cretzschmar (1826, p. 31, lámina x), estaba ya empleado por Gmelin para una raza de perro doméstico. *Canis riparius* Hemprich y Ehrenberg (1832) es probablemente el nombre válido para este chacal, que deberá llamarse *Thos riparius*, o más bien *Thos aureus riparius*.

Hace poco tiempo, Kaschenko ha descrito bajo el nombre de *Vulpes corsac nigra* una zorra de la Transbaikalia (1), pero este nombre, *nigra*, fué usado nada menos que en 1797 por Borkhausen para una variedad accidental del zorro común de Europa, y, por tanto, no puede emplearse de nuevo en el género *Vulpes*. Si, como es muy verosímil, el zorro transbaikálico representa una forma diferente del verdadero *corsac*, de una región más occidental, habría que buscar para ella un nombre nuevo. Las circunstancias porque atraviesa el mundo me han impedido comunicar a Kaschenko, como sería lo correcto, este caso de homonimia, que por esta razón hago aquí público.

(1) *Ann. Mus. Zool. Saint Petersburg.*, xvii, 1912, p. 393.

