



**CARLOS BRUCH, Un nuevo estafilínido mirmecófilo.**

Dedicado a la recolección de insectos mirmecófilos, he vuelto a encontrar durante el verano pasado cierto número del estafilínido *Myrmecosaurus vagans* BRUCH (1), huésped de *Solenopsis saevissima* var. *MacDonaghi* SANTS., que abunda por los alrededores de La Granja (Alta

(1) Descrito en PHYSIS, tomo IV, páginas 187-190, figuras, 1918.

Gracia). En una sola oportunidad hallé debajo de una piedra, y en compañía de las mismas hormigas, tres otros ejemplares pertenecientes también al género *Myrmecosaurus*, pero que, a primera vista, son distintos de la especie *vagans*, como me confirmó un estudio más detenido.



*Myrmecosaurus laticeps* n. sp.

Esta especie tiene la escultura y los surcos elitrales característicos de *M. Gallardoi* BRÈTH., pero por la forma del pronoto, la anchura del cuerpo y de los élitros se asemeja más a *M. vagans*, siendo su cabeza mucho más dilatada hacia atrás, razón por qué la llamaré

*Myrmecosaurus laticeps*  
n. sp.

Largo : 4 milímetros; anchura máxima : 1 milímetro.

De color ferrugíneo oscuro o pardo-rojizo. Las antenas, clípeo y miembros, más claros, amarillentos. Subopaco con el abdomen algo más lustroso. Cabeza, pronoto y élitros glabros, cubiertos de una

granulación puntiforme, lustrosa y regular apretada; el abdomen muy fino y densamente puntuado y pubescente, el último segmento con algunas finas setas.

La cabeza (sin el clípeo) es tan ancha como larga; su porción post-lateral, después de los ojos, es fuertemente ensanchada hacia los ángulos posteriores y en el borde carenado, los ángulos son redondeados; las carenas superolaterales son agudas, ligeramente divergentes hacia los lóbulos preoculares, que son algo levantados; el surco longitudinal mediano, como las carenas, son poco manifestos, éstas últimas terminan en dos tubérculos preoccipitales, más o menos desarrollados. Las antenas son

apenas más largas que la cabeza, con el clipeo incluido, más cortas y menos pubescentes que en *M. Gallardoi*, sus artículos un poco más largos que en *M. vagans*.

El pronoto es suborbicular, en un individuo casi exagonal y lleva las aristas agudas, características a las demás especies. El escudete es pequeño, subtriangular.

Los élitros son algo más largos que en *M. vagans*, su forma es la misma; bastante planos y ensanchados hacia atrás, con los ángulos redondeados; cada élitro lleva dos carenas o costillas, abreviadas atrás, cuyo espacio externo es mucho más ancho que los internos; el borde lateral de los élitros es también carenado, el margen pleural recogido y anchamente canaliculado como en las otras especies.

El abdomen y los miembros son como en *M. vagans*.