29 ABR 1926
CABRERA - 25

ANGEL CABRERA

UNA NUEVA FORMA DE CAGUAN DE LA ISLA DE BORNEO

EXTRACTO DEL BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Tomo XXIV, 1924 (páginas 128 a 130).

MUSEO DE LA PLATA
BIBLIOTECA

MADRID, 1924

Knoll 81

Una nueva forma de caguan de la isla de Borneo

por

Angel Cabrera.

Aunque en varias ocasiones ha manifestado Thomas su opinión de que los caguanes de Borneo, las Natunas, Aor y Río-Linga representan una misma especie, del primero de estos países han descrito Lyon y el conde Gyldenstolpe dos *Galeopterus* que, juzgando por las descripciones y figuras, son perfectamente distintos entre sí, y a la vez distintos de las formas que habitan las otras islas mencionadas. Una de estas dos especies (*G. borneanus* Lyon) es del E. de Borneo, y la otra (*G. lechei* Gyldenst.) del centro. Al estudiar este grupo con motivo de la preparación de un nuevo tomo de mi *Genera Mammalium*, me he encontrado con que el *Galeopterus* de Sarawak no pertenece a ninguna de estas dos formas, asemejándose mucho más a las que viven en las Natunas; pero tampoco es enteramente idéntico a ellas. Es muy probable que este caguan del Borneo occidental, *G. natunae* de Bungurán, y *G. gracilis* de Sirhasen, no sean sino razas locales de una misma especie; pero hasta tanto que el estudio comparativo de grandes series procedentes de las diversas localidades permita establecer las verdaderas relaciones entre las distintas formas, creo lo más conveniente considerar a cada una de éstas, para los efectos de nomenclatura, como una especie. Para la forma del noroeste de Borneo propongo el nombre de

Galeopterus hantu sp. n. [1].

Pertenece este caguan al grupo de mediano tamaño, con dientes pequeños, en el que entran también *natunae, gracilis* y *lechei*, y se caracteriza, sobre todo, por lo ancho de su cráneo y por la forma del paladar, relativamente ensanchado anteriormente, de manera que las series dentales, que son casi rectas, resultan prácticamente paralelas. El tipo es una ♀ adulta, obtenida por Mr. Ch.

[1] «Hantus», en la mitología dayak, son los espíritus o genios que pueblan los bosques.

Hose en el distrito de Baram (Sarawak), número 20·II·19·9 del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Sólo conozco de esta forma la fase gris. En el tipo, el dorso es gris de humo pálido, ligeramente jaspeado de negro, pasando el gris a ante aceitunado sobre todo el patagio, y a ante aceitunado obscuro en la cabeza, cuello y hombros. A cada lado de éstos hay una zona casi blanca, con jaspeaduras negras, formando varias líneas oblicuas. Hocico negruzco. Una mancha subocular blanca, como en *G. lechei*. Partes inferiores de un color de ante sucio, tirando a pardo-ante en la garganta, y a isabela en la superficie ventral del patagio. A los lados del cuello, la cara inferior del propatagio es de un color canela-rojizo fuerte. Las extremidades, sobre todo las anteriores, presentan muchas motas blancas. En otro ejemplar que he visto de Sarawak, el matiz general es más obscuro y más uniforme.

Dimensiones del tipo: pie posterior, sin las uñas, 65 mm.; cola, 200. Cráneo (con el occipital roto): longitud lateral del paladar, 33; distancia desde el borde orbitario anterior a la escotadura nasal lateral, 24,5; ancho de la caja cerebral, 27; ancho cigomático, 42; ancho orbitario máximo, 45; estrechamiento interorbitario, 18,5; ancho palatino delante del incisivo anterior, 15; ancho palatino entre el pm^2 y el pm^3, 19; anchura interalveolar en el m^3, 16; serie dentaria superior, completa, 33,8; longitud del pm^4 y los tres molares, 13,5; mandíbula, 53; altura de la misma en la apófisis coronoides, 23; serie dental inferior, completa, 39.

Cráneo parecido, en sus proporciones generales, al de *G. lechei*, pero con los nasales «pellizcados», por decirlo así, es decir, levantados y comprimidos lateralmente en su parte superior, tendiendo a formar cresta, como en *G. borneanus*.

Esta forma de *Galeopterus* es fácil de distinguir de las otras dos que viven en Borneo. *G. borneanus* pertenece al grupo de dientes grandes, y además, a juzgar por las figuras del conde Gyldenstolpe, la forma del cráneo es muy diferente; *G. lechei*, que es una especie de dientes pequeños, como la de Sarawak, no tiene los nasales «pellizcados», y es notable por lo corto de la cola, que mide, próximamente, la mitad que en *hantu*. En cuanto a los caguanes de las islas próximas a la costa occidental de Borneo, *natunae* y *gracilis* pertenecen también al grupo de dientes pequeños, y tienen los nasales tendiendo a formar cresta; pero en ambos, la caja cerebral es menos ancha, la mandíbula menos alta,

y el paladar se estrecha más sensiblemente por delante. Midiendo la anchura del paladar, delante de los incisivos anteriores y luego al nivel del espacio entre el pm^3 y el pm^4, en *natunae* y *gracilis* hay entre ambas medidas una diferencia de ocho milímetros, mientras en *hantu* no pasa de cuatro milímetros. *G. abbotti*, de Pulo Panebangan, no puede confundirse con este último, siendo una especie de tamaño muy pequeño, y con los nasales planos, como en *lechei*. Por otra parte, sería poco verosímil que el caguan de Sarawak, siendo, como evidentemente es, distinto de los que viven en el centro y levante del mismo Borneo, fuese el mismo que se encuentra en otras islas.


Id: 002758